PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶:

A61K 7/48, 7/06

A1

(11) Numéro de publication internationale: WO 98/24407

(43) Date de publication internationale: 11 juin 1998 (11.06.98)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR97/02084

(22) Date de dépôt international: 19 novembre 1997 (19.11.97)

(30) Données relatives à la priorité:
96/15046 6 décembre 1996 (06.12.96) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): L'OREAL [FR/FR]; 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): DURANTON, Albert [FR/FR]; 7, rue Jacques Kablé, F-75018 Paris (FR). PRUCHE, Francis [FR/FR]; 5, Villa Moncalm, F-75018 Paris (FR).

(74) Mandataire: TEZIER HERMAN, Béatrice; L'Oréal - DPI, 90, rue du Général Roguet, F-92583 Clichy Cedex (FR).

(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF; CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont recues.

(54) Title: USE OF PARACETAMOL AS DEPIGMENTING AGENT

(54) Titre: UTILISATION DU PARACETAMOL COMME AGENT DEPIGMENTANT

(57) Abstract

The invention concerns the use of paracetamol in a composition as depigmenting and/or bleaching agent for human skin, hairs and/or hair, and a depigmenting composition containing paracetamol. It also concerns a method for depigmenting and/or bleaching the skin, hairs and/or hair, which consists in applying on human skin, hairs and/or hair a composition containing paracetamol.

(57) Abrégé

L'invention se rapporte à l'utilisation du paracétamol dans une composition comme agent dépigmentant et/ou blanchissant de la peau humaine, des poils et/ou des cheveux, ainsi qu'à une composition dépigmentante contenant du paracétamol. Elle se rapporte également à un procédé de dépigmentation et/ou de blanchissement de la peau, des poils et/ou des cheveux, consistant à appliquer sur la peau humaine, les poils et/ou les cheveux une composition comprenant le paracétamol.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénic
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
ΑZ	Azerbaidjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad ·
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquic
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolic	UA	Ukraine
BR	Brésil	11.	Israël .	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	ıT	Italie	MX	Mexique	UZ.	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	, JP	Japon . ,	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PŁ	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
cz	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE .	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

10

15

20

25

Utilisation du paracétamol comme agent dépigmentant

La présente invention se rapporte à l'utilisation du paracétamol comme agent dépigmentant ou blanchissant dans une composition cosmétique et/ou dermatologique, ainsi qu'à une composition dépigmentante et/ou blanchissante contenant le paracétamol.

La couleur de la peau humaine est fonction de différents facteurs et notamment des saisons de l'année, de la race et du sexe, et elle est principalement déterminée par la nature et la concentration de mélanine produite par les mélanocytes. Les mélanocytes sont les cellules spécialisées qui par l'intermédiaire d'organelles particuliers, les mélanosomes, synthétisent la mélanine. En outre, à différentes périodes de leur vie, certaines personnes voient apparaître sur la peau et plus spécialement sur les mains, des taches plus foncées et/ou plus colorées, conférant à la peau une hétérogénéité. Ces taches sont dues aussi à une concentration importante de mélanine dans les kératinocytes situés à la surface de la peau.

De la même manière, la couleur des poils et des cheveux est due à la mélanine, lorsque les poils ou les cheveux sont foncés, certaines personnes désirent voir ceux-ci plus claires. Ceci est particulièrement intéressant pour les poils qui sont moins visibles lorsqu'ils sont clairs que lorsqu'ils sont foncés.

Le mécanisme de formation de la pigmentation de la peau, des poils et des cheveux, c'est-à-dire de la formation de la mélanine est particulièrement complexe et fait intervenir schématiquement les principales étapes suivantes :

Tyrosine ---> Dopa ---> Dopaquinone ---> Dopachrome ---> Mélanine

30 La tyrosinase (monophénol dihydroxyl phénylalanine : oxygen oxydo-reductase EC 1,14,18,1) est l'enzyme essentielle intervenant dans cette suite de

réactions. Elle catalyse notamment la réaction de transformation de la tyrosine en Dopa (dihydroxyphénylalanine) grâce à son activité hydroxylase et la réaction de transformation de la Dopa en dopaquinone grâce à son activité oxydase. Cette tyrosinase n'agit que lorsqu'elle est à l'état de maturation sous l'action de certains facteurs biologiques.

Une substance est reconnue comme dépigmentante si elle agit directement sur la vitalité des mélanocytes épidermiques où se déroule la mélanogénèse et/ou si elle interfère avec une des étapes de la biosynthèse de la mélanine soit en inhibant une des enzymes impliquées dans la mélanogénèse soit en s'intercalant comme analogue structural d'un des composés chimiques de la chaîne de synthèse de la mélanine, chaîne qui peut alors être bloquée et ainsi assurer la dépigmentation.

Les substances les plus utilisées en tant que dépigmentants sont plus particulièrement l'hydroquinone et ses dérivés, en particulier ses éthers tels que le monométhyléther et le monoéthyléther d'hydroquinone. Ces composés, bien qu'ils présentent une efficacité certaine, ne sont malheureusement pas exempts d'effets secondaires du fait de leur toxicité, ce qui peut rendre leur emploi délicat, voire dangereux. Cette toxicité provient de ce qu'ils interviennent sur des mécanismes fondamentaux de la mélanogénèse en tuant des cellules qui risquent alors de perturber leur environnement biologique et qui par conséquent obligent la peau à les évacuer en produisant des toxines.

Ainsi, l'hydroquinone est un composé particulièrement irritant et cytotoxique pour le mélanocyte, dont le remplacement, total ou partiel a été envisagé par de nombreux auteurs.

On a ainsi cherché des substances qui n'interviennent pas dans le mécanisme 30 de la mélanogénèse mais qui agissent en amont sur la tyrosinase en empêchant son activation et sont de ce fait beaucoup moins toxiques. On

15

20

25

30

utilise couramment comme inhibiteur de l'activation de la tyrosinase l'acide kojique qui complexe le cuivre présent dans le site actif de cette enzyme. Malheureusement, ce composé peut provoquer des réactions d'allergie ("Contact allergy to kojic acid in skin care products", Nakagawa M. et al., in Contact Dermatitis, Jan. 95, Vol 42 (1), pp.9-13). Ce composé est également instable en solution, ce qui complique quelque peu la fabrication de la composition.

L'utilisation de substances dépigmentantes topiques inoffensives présentant une bonne efficacité est tout particulièrement recherchée en vue de traiter les hyperpigmentations régionales par hyperactivité mélanocytaire telles que les mélasmas idiopathiques, survenant lors de la grossesse ("masque de grossesse" ou chloasma) ou d'une contraception oestro-progestative, les hyperpigmentations localisées par hyperactivité et prolifération mélanocytaire bénigne, telles que les taches pigmentaires séniles dites lentigo actiniques, les hyperpigmentations ou dépigmentations accidentelles, éventuellement dues à la photosensibilisation ou à la cicatrisation post-lésionnelle, ainsi que certaines leucodermies, telles que le vitiligo. Pour ces dernières (les cicatrisations pouvant aboutir à une cicatrice donnant à la peau un aspect plus blanc et les leucodermies), à défaut de pouvoir repigmenter la peau lésée, on achève de dépigmenter les zones de peau normale résiduelle pour donner à l'ensemble de la peau une teinte blanche homogène.

Aussi, il subsiste le besoin d'un nouvel agent blanchissant de la peau humaine, des poils et/ou des cheveux à action aussi efficace que ceux connus, mais n'ayant pas leurs inconvénients, c'est-à-dire qui soit non irritant, non toxique et/ou non allergisant pour la peau et stable dans une composition.

La demanderesse a trouvé de manière inattendue que le paracétamol présentait la propriété d'inhiber la tyrosinase, et donc la synthèse de la mélanine, et pouvait ainsi agir efficacement sur la pigmentation et les taches de

la peau ou sur la pigmentation des poils et/ou des cheveux sans une quelconque toxicité.

Le paracétamol est le N-(4-hydroxyphenyl)acétamide (ou acétaminophène).

5

25

30

Il est connu depuis de nombreuses années comme agent antipyrétique et analgésique. Toutefois personne jusqu'à ce jour n'avait envisagé de l'utiliser comme agent dépigmentant.

- La présente invention a donc pour objet l'utilisation du paracétamol dans et/ou pour la fabrication d'une composition cosmétique et/ou dermatologique pour dépigmenter et/ou blanchir la peau humaine et/ou enlever les taches pigmentaires de la peau et/ou dépigmenter les poils et/ou les cheveux.
- La présente invention a aussi pour objet l'utilisation du paracétamol dans et/ou pour la fabrication d'une composition cosmétique et/ou dermatologique, comme inhibiteur de la tyrosinase et/ou de la synthèse de la mélanine.
- En effet, sans vouloir se lier à une quelconque théorie de l'invention, il semble que le paracétamol agit non pas comme substrat de la tyrosinase, mais comme un inhibiteur des activités hydroxylase et oxydase de la tyrosinase.

La présente invention a aussi pour objet l'utilisation du paracétamol dans une composition cosmétique dépigmentante et/ou blanchissante de la peau humaine, des poils ou des cheveux.

La présente invention a aussi pour objet une composition dépigmentante ou blanchissante, caractérisée en ce qu'elle contient, dans un milieu cosmétiquement et/ou dermatologiquement acceptable, du paracétamol. Cette composition est plus particulièrement destinée à un usage topique sur la peau et/ou ses phanères (cheveux, poils et ongles).

WO 98/24407 PCT/FR97/02084

5

La présente invention se rapporte également à un procédé cosmétique et/ou dermatologique de dépigmentation et/ou de blanchiment de la peau humaine, des poils ou des cheveux consistant à appliquer sur la peau, les poils ou les cheveux une composition selon l'invention.

La composition selon l'invention est appropriée pour une utilisation topique et contient donc un milieu cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable, c'est-à-dire compatible avec la peau, les poils ou les cheveux.

10

15

20

25

30

Le paracétamol peut être notamment présent en une quantité allant de 0,01 à 10 % et de préférence de 0,3 à 3 % du poids total de la composition.

La composition de l'invention peut se présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées pour une application topique, notamment sous forme d'une solution aqueuse, hydroalcoolique ou huileuse, d'une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d'un gel aqueux ou huileux, d'un produit anhydre liquide, pâteux ou solide, d'une dispersion d'huile dans une phase aqueuse à l'aide de sphérules, ces sphérules pouvant être des nanoparticules polymériques telles que les nanosphères et les nanocapsules ou mieux des vésicules lipidiques de type ionique et/ou non-ionique.

Cette composition peut être plus ou moins fluide et avoir l'aspect d'une crème blanche ou colorée, d'une pommade, d'un lait, d'une lotion, d'un sérum, d'une pâte, d'une mousse. Elle peut éventuellement être appliquée sur la peau ou sur les cheveux sous forme d'aérosol. Elle peut également se présenter sous forme solide, et par exemple sous forme de stick. Elle peut être utilisée comme produit de soin et/ou comme produit de maquillage. Elle peut également être sous une forme de shampooings ou après-shampooings. Elle peut enfin se présenter sous forme de patch.

10

15

De façon connue, la composition de l'invention peut contenir également les adjuvants habituels dans les domaines cosmétique et dermatòlogique, tels que les gélifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les conservateurs, les antioxydants, les solvants, les parfums, les charges, les filtres, les pigments, les absorbeurs d'odeur et les matières colorantes. Les quantités de ces différents adjuvants sont celles classiquement utilisées dans les domaines considérés, et par exemple de 0,01 à 20 % du poids total de la composition. Ces adjuvants, selon leur nature, peuvent être introduits dans la phase grasse, dans la phase aqueuse, dans les vésicules lipidiques et/ou dans les nanoparticules.

Lorsque la composition de l'invention est une émulsion, la proportion de la phase grasse peut aller de 5 à 80 % en poids, et de préférence de 5 à 50 % en poids par rapport au poids total de la composition. Les huiles, les émulsionnants et les coémulsionnants utilisés dans la composition sous forme d'émulsion sont choisis parmi ceux classiquement utilisés dans le domaine considéré. L'émulsionnant et le coémulsionnant sont présents, dans la composition, en une proportion allant de 0,3 à 30 % en poids, et de préférence de 0,5 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

20

25

30

Comme huiles utilisables dans l'invention, on peut citer les huiles minérales (huile de vaseline), les huiles d'origine végétale (huile d'avocat, huile de soja), les huiles d'origine animale (lanoline), les huiles de synthèse (perhydrosqualène), les huiles siliconées (cyclométhicone) et les huiles fluorées (perfluoropolyéthers). On peut aussi utiliser comme matières grasses des alcools gras (alcool cétylique), des acides gras, des cires (cire de carnauba, ozokérite).

Comme émulsionnants et coémulsionnants utilisables dans l'invention, on peut citer par exemple les esters d'acide gras et de polyéthylène glycol tels que le

WO 98/24407 PCT/FR97/02084

7

stéarate de PEG-20, et les esters d'acide gras et de glycérine tels que le stéarate de glycéryle.

Comme gélifiants hydrophiles, on peut citer en particulier les polymères carboxyvinyliques (carbomer), les copolymères acryliques tels que les copolymères d'acrylates/alkylacrylates, les polyacrylamides, les polysaccharides, les gommes naturelles et les argiles, et, comme gélifiants lipophiles, on peut citer les argiles modifiées comme les bentones, les sels métalliques d'acides gras, la silice hydrophobe et les polyéthylènes.

10

15

20

25

5

Comme actifs, on peut utiliser notamment les polyols (glycérine, propylène glycol), les vitamines, les agents kératolytiques et/ou desquamants (acide salicylique et ses dérivés, alpha-hydroxyacides, acide ascorbique et ses dérivés), les agents anti-inflammatoires, les agents apaisants et leurs mélanges. On peut également associer le paracétamol à d'autres agents dépigmentants, tels que l'acide kojique ou l'hydroquinone et ses dérivés, ce qui permet d'utiliser ces derniers à des doses moins toxiques pour la peau. En cas d'incompatibilité, ces actifs et/ou le paracétamol peuvent être incorporés dans des sphérules, notamment des vésicules ioniques ou non-ioniques et/ou des nanoparticules (nanocapsules et/ou nanosphères), de manière à les isoler les uns des autres dans la composition.

La composition est généralement appliquée sur la partie (peau ou muqueuses) à traiter, puis peut être éventuellement maintenue en position par une pièce (patch) adhésive. La pièce adhésive peut permettre une occlusion partielle ou totale de la composition sur la partie à traiter. On peut par exemple utiliser, comme pansement adhésif, le produit Tegaderm® vendu par les Laboratoires 3M Santé ou, comme pièce adhésive, le produit Finn Chambers® vendu par la société Promédica.

WO 98/24407 PCT/FR97/02084

8

Tests:

- Des tests ont mis en évidence l'activité du paracétamol comme inhibiteur de la tyrosinase par évaluation de ses effets inhibiteurs sur l'activité tyrosine hydroxylase et sur l'activité dopa-oxydase de la tyrosinase de champignons.

5

10

15

Selon ce test, on suit par spectrométrie visible à 475 nm la quantité de dopachrome formée (produit intermédiaire avant les réactions d'oxydation non enzymatiques aboutissant à la formation de mélanine) en fonction du temps. Ces réactions sont catalysées in vitro par la tyrosinase de champignons (5μg à 3400 unités/mg, vendue par Sigma) en présence d'une part de 250μM de L-tyrosine (figure 1) et d'autre part de 250μM de L-dopa (figure 2) avec 100μM de paracétamol.

Le milieu réactionnel utilisé pour réaliser ce test correspond à 1 ml d'une solution de tampon phosphate (Dulbecco's PBS) à pH = 7,4. Pour le témoin, la quantité d'inhibiteur a été remplacée par le même tampon phosphate à pH = 7,4. Le zéro des courbes a été également étalonné à l'aide du tampon phosphate.

20 Les courbes présentées sur les figures 1 et 2 ont été tracées en suivant, en ordonnée, la densité optique obtenue par la dopachrome formée en fonction du temps indiqué en abscisse et exprimé en secondes. Les courbes (a) (ou représentés par •) sont relatives au témoin et les courbes (b) (ou représentés par x) sont relatives au paracétamol.

25

En comparant les deux courbes d'une même figure, on voit nettement que la présence de paracétamol entraîne un net ralentissement de la quantité de dopachrome formée au cours du temps, ce qui signifie que le paracétamol présente un effet d'inhibition de la tyrosinase.

- Par ailleurs, il a été réalisé le spectre d'absorption entre 190nm et 540nm pour suivre une éventuelle réaction du paracétamol avec la tyrosinase. Dans les mêmes conditions que précédemment avec des concentrations en paracétamol qui sont ici de 1mM et 100μM et avec un temps d'incubation de 2 heures à 30°C, on n'observe aucune modification de la densité optique par rapport au témoin. Ce qui permet de dire que le paracétamol est un très mauvais substrat de la tyrosinase.

L'invention va maintenant être illustrée à l'aide des exemples qui suivent. Les concentrations sont données en pourcentage en poids.

Exemple 1 : Crème traitante

	-	Alcool cétylique	1,0	5 %
15	-	Stéarate de PEG-20 (Myrj 49 vendu par la société IC	1) 2	%
	-	Cyclométhicone	6	%
	-	Paracétamol	0,5	%
	- ·	Carbomer	0,6	%
	-	Glycérine	3	%
20	-	Triéthanolamine	1	%.
	-	Conservateurs	0,5	%
	-	Eau déminéralisée	qsp 100	%

La crème obtenue utilisée en application quotidienne, permet d'obtenir un blanchiment de la peau.

Exemple 2 : Gel traitant

30	-	Propylène glycol	10	%
	-	Alcool éthylique	40	%

/FR97/0208	J <i>Z</i> U84
1 T.	

	-	Glycérine	. 3	%
	-	Paracétamol	0,5	%
	-	Conservateurs	0,15	%
	٠ -	Parfum	0,15	%
5	-	Eau déminéralisée	qsp 100	%

Le gel obtenu peut être utilisé quotidiennement et est apte à dépigmenter la peau.

10

Exemple 3: Stick traitant

	- Cire de Carnauba	5	%
٧	- Ozokerite	7	%
15	- Lanoline	6	%
	- Dioxyde de titane (pigments)	20	%
	- Amidon de riz (charge)	7	%
	- EDTA	0,1	%
	- Paracétamol	2	%
20	- Perhydrosqualène	qsp 100	%

Le stick obtenu, utilisé sur les taches pigmentaires, permet de les atténuer voire de les faire disparaître.

25 Exemple 4 : Patch dépigmentant :

Le patch auto-adhésif contient 1% de paracétamol immobilisé.

Le patch est appliqué quotidiennement le soir sur une zone à dépigmenter comme les taches pigmentaires.

30

Exemple 4:

Mise en évidence de l'effet dépigmentant par voie topique sur la peau d'une composition comprenant du paracétamol

5 Composition:

Paracétamol à 5% en poids par volume d'une solution constituée par : eau (22g), propylène glycol (23g) et alcool (55g).

Le traitement consiste à appliquer sur deux surfaces d'avant-bras de 1cm² préalablement rasées 50µl de la composition d'une part (zone "paracétamol") et 50µl du véhicule (solution mentionnée ci-dessus sans le paracétamol) (zone "véhicule") d'autre part, et ceci matin et soir pendant plus d'un mois (du 17 octobre au 23 novembre). Cette application se fait à l'aide d'une pipette, on attend 10 secondes de contact avant de masser légèrement jusqu'à séchage de la surface.

Le 19 novembre, on irradie les surfaces de peau préalablement traitées, soit par la composition, soit par le véhicule, avec des rayonnements UV-B pendant 6 minutes (environ 1 M.E.D.). On irradie également deux surfaces de la peau rasée non traitée adjacentes aux deux autres zones qui servent de témoin (zone "témoin").

On suit la colorimétrie (colorimètre Minolta CR200®) pendant 4 jours de ces zones (le jour 0 correspondant au 19 novembre).

Trois domaines de colorimétrie sont pris en compte. Ainsi, de manière schématique, L, qui est la luminance, correspond à la clarté de la peau (plus L est grand, plus la peau est claire), A correspond à la rougeur de la peau (due notamment à l'érythème post-UV-B), B correspond à la couleur jaune de la peau (plus B est grand, plus il y a pigmentation mélanique).

20

La figure 3 représente la différence de luminance de la zone "paracétamol" (c) d'une part, de la zone "véhicule" (d) d'autre part avec la zone "témoin" correspondante en fonction du temps (exprimé en jour : nov correspond à novembre).

5

La figure 4 représente la différence de rougeur de la zone "paracétamol" (c) d'une part, de la zone "véhicule" (d) d'autre part avec la zone "témoin" correspondante en fonction du temps (exprimé en jour).

La figure 5 représente la différence de jaune de la zone "paracétamol" (c) d'une part, de la zone "véhicule" (d) d'autre part avec la zone "témoin" correspondante en fonction du temps (exprimé en jour).

On s'aperçoit que, dans ces trois domaines de colorimétrie, la zone

"paracétamol" correspond bien à une peau dépigmentée par rapport à la zone
"véhicule".

REVENDICATIONS

- 1. Utilisation du paracétamol dans et/ou pour la fabrication d'une composition cosmétique et/ou dermatologique pour dépigmenter et/ou blanchir la peau humaine et/ou enlever les taches pigmentaires de la peau et/ou dépigmenter les poils et/ou les cheveux.
- 2. Utilisation du paracétamol dans et/ou pour la fabrication d'une composition cosmétique et/ou dermatologique, comme inhibiteur de la tyrosinase et/ou de la synthèse de la mélanine.
 - 3. Utilisation du paracétamol dans une composition cosmétique dépigmentante et/ou blanchissante de la peau humaine, des poils ou des cheveux.

15

10

5

- 4. Composition dépigmentante ou blanchissante, caractérisée en ce qu'elle comprend, dans un milieu cosmétiquement et/ou dermatologiquement acceptable, du paracétamol.
- 5. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle est destinée à un usage topique sur la peau et/ou ses phanères.
- Utilisation et composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le paracétamol est présent en une
 quantité allant de 0,01 à 10 % du poids total de la composition.
 - 7. Utilisation et composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le paracétamol est présent en une quantité allant de 0,3 à 3 % du poids total de la composition.

8. Utilisation et composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition comprend en outre, au moins un actif choisi parmi les agents kératolytiques et/ou desquamants, anti-inflammatoires, apaisants, autres agents dépigmentants et leurs mélanges.

5

- 9. Utilisation et composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le paracétamol et/ou l'actif est encapsulé dans des sphérules.
- 10. Procédé cosmétique de dépigmentation et/ou blanchiment de la peau humaine, des poils ou des cheveux, caractérisé en ce qu'il consiste à appliquer sur la peau, les poils ou les cheveux une composition décrite selon l'une des revendications précédentes 4 à 9.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte 'onal Application No PCT/FR 97/02084

A. CLASSIF IPC 6	ICATION OF SUBJECT MATTER A61K7/48 A61K7/06		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC	•
B. FIELDS		callott and tro	
	cumentation searched (classification system followed by classification	tion symbols)	
IPC 6	A61K		
Documentat	on searched other than minimumdocumentation to the extent that	such documents are included in the fields sea	rched
Electronic da	ta base consulted during the international search (name of data b	oase and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	`	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	elevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 95 24179 A (PROCTER & GAMBLE September 1995	,	1-10
*	see page 11, line 21; claims 1-	10	
i			
			,
		•	
Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	п аплех.
"A" docum consk "E" earlier filing c "L" docum which citatio "O" docum other "P" docum later t	tegories of cited documents: ant defining the general state of the art which is not leved to be of particular relevance document but published on or after the international late into the publication or international solution or into the publication of the publication of the publication of the publication of the publication or international reason (as specified) and referring to an oral disclosure, use, exhibition or means and published prior to the international filing date but the priority date claimed actual completion of the international search	"T" later document published after the interest or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvior in the art. "&" document member of the same patent	the application but acry underlying the laimed invention be considered to current is taken alone laimed invention ventive step when the ore other such docu- us to a person skilled family
	April 1998	14/04/1998	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Fischer, J.P.	•

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter onal Application No PCT/FR 97/02084

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9524179 A	14-09-95	AU 1982595 A CA 2185231 A CN 1145582 A CZ 9602673 A EP 0748203 A JP 9510208 T	25-09-95 14-09-95 19-03-97 12-03-97 18-12-96 14-10-97

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Der Je Internationale No PCT/FR 97/02084

	·	1017111 21	
A. CLASSE CIB 6	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE A61K7/48 A61K7/06		
Selon la clas	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifica	ution nationale et la CIB	
B. DOMAIN	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
CIB 6	tion minimale consultée (système de classification suivi des symboles de A61K	e classement)	
Documental	tion consultée autre que la documentationminimale dans la mesure où d	ces documents relèvent des domaines su	r lesquels a porté la recherche
Base de dor utilisés)	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (n	om de la base de données, et si cela est	réalisable, termes de recherche
			•
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		,
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication de	es passages pertinents	no, des revendications visées
A .	WO 95 24179 A (PROCTER & GAMBLE) 1 septembre 1995 voir page 11, ligne 21; revendicat 1-10		1-10
	1-10		
•	-		
	·		·
Voir	la suite du cadre C pour la finde la liste des documents	Les documents de familles de bro	evets sont indiqués en annexe
"A" docum	es spéciales de documents cités: - Tient définissant l'état général de latechnique, non déré comme particulièrement pertinent	" document ultérieur publié après la date date de priorité et n'appartenenant par technique pertinent, mais cité pour cc ou la théorie constituant la base de l'	as à l'état de la emprendre le principe
ou ap	ent pouvant jeter un doute sur une revendcation de	(* document particulièrement pertinent; être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document co	'invention revendiquée ne peut comme impliquant une activité onsidéré isolément
. autre "O" docum une e	citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) nent se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens	document particutièrement pertinent; ne peut être considérée comme impl lorsque le document est associé à ur documents de même nature, cette co pour une personne du métier	iquant une activité inventive n ou plusieurs autres
posté	nent publié avant la date de dépôtinternational, mais rieurement à la date de priorité revendiquée "é uelle la recherche internationale a étéeffectivement achevée	A* document qui fait partie de la même fo	·
	Lavril 1998	14/04/1998	
	resse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentilaan 2	Fonctionnaire autorisé	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Fischer, J.P.	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifsx membres de familles de brevets

De: 1e Internationale No PCT/FR 97/02084

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9524179 A	14-09-95	AU 1982595 A CA 2185231 A CN 1145582 A CZ 9602673 A EP 0748203 A JP 9510208 T	25-09-95 14-09-95 19-03-97 12-03-97 18-12-96 14-10-97